



SANDOZ



Fentanyl Matrixpleister




SANDOZ

Fentanyl Matrixpleister

Fentanyl Matrixpleisters zijn pleisters met een pijnstiller. De stof fentanyl zorgt voor de pijnstillende werking. Op dit informatievel leest u hoe u de pleister op de juiste wijze gebruikt. Uw arts bepaalt welke sterkte van fentanyl u moet gebruiken, hoeveel en hoe vaak. Houdt u altijd aan dit voorschrift.

Instructie

- 1 Zoek een onbeschadigde plek op de huid, zo haarloos mogelijk, op de bovenste helft van de romp of op de bovenarm. Er mogen geen wondjes zijn. Ook mag de huid op die plek niet rood, verbrand of bestraald zijn. Knip met een schaar eventuele haren weg. Niet scheren, want dat beschadigt de huid.



- 2 Zorg dat de huid helemaal droog is voordat u de pleister opplakt! Als u de huid nog wilt wassen, gebruik dan alleen water. Gebruik geen crème, lotion, olie of poeder.



Vervolg instructie z.o.z.

Belangrijk: Lees voor gebruik ook de bijsluiter goed door!

Vervolg instructie Fentanyl Matrixpleisters

- 3** Open het zakje bij de inkeping. Gebruik geen schaar want dat kan de pleister beschadigen. Scheur het zakje aan de rand open en haal de pleister eruit.



- 4** Haal beide delen van de beschermstrip van de pleister. Raak de plakzijde zo min mogelijk aan om de pleister zo goed mogelijk te laten plakken.



- 5** Plak de pleister op de huid en druk hem gedurende ongeveer 30 seconden stevig aan met de vlakke hand. Zorg ervoor dat de hele pleister met de huid in aanraking is en druk randen en hoeken goed vast.



- 6** **Op het doosje kunt u de datum noteren waarop u een pleister heeft aangebracht. Zo kunt u goed nagaan wanneer het tijd is om de pleister te vervangen door een nieuwe. U kunt de pleister drie dagen (72 uur) laten zitten, afhankelijk van het voorschrift van de arts. U kunt ermee in bad, onder de douche en zwemmen.**

- 7** Verwijder de pleister door hem los te trekken. De huid onder de pleister kan roodachtig zijn, maar dit trekt binnen enkele uren bij.



- 8** Breng na het verwijderen van de pleister meteen een nieuwe pleister aan, maar niet op dezelfde plek als de vorige. Zoek een andere geschikte plek op de huid.



- 9** Vouw een gebruikte pleister altijd onmiddellijk dubbel, met de plakzijde naar binnen. Doe hem bij het klein chemisch afval of breng hem terug naar uw apotheek



Sandoz B.V.

Postbus 10332, 1301 AH Almere, Tel. 036 524 16 00, Fax 036 537 33 22, www.sandoz.nl