


# Inhalatie-instructie Beclometason Sandoz en Salbutamol Sandoz

Is de inhalator nieuw of drie dagen of langer niet gebruikt? Schud hem dan goed en verstuif een keer in de lucht om er zeker van te zijn dat hij werkt.

- 1 Verwijder het kapje van het mondstuk van de inhalator. Houd de inhalator tussen duim en wijsvinger vast, zoals op het plaatje (met de opening naar beneden).




- 2 Schud de inhalator zonder hem in te drukken.




- 3 Adem zo goed mogelijk uit.
- 4 Plaats vervolgens het mondstuk in uw mond tussen uw tanden. Sluit uw lippen om het mondstuk.

Let op dat u met tong of tanden de inhalatie-opening niet afsluit.



- 5 Terwijl u langzaam inademt door uw mond, drukt u op de bovenkant van de inhalator. Zo wordt de verstuiving afgegeven. Houd uw adem zo lang mogelijk in en haal de inhalator daarna uit uw mond.



Als u nog een verstuiving neemt, houd de inhalator dan rechtop en wacht dan ongeveer een halve minuut voordat u stappen **2** tot en met **5** herhaalt.

**Let op!** Voer de stappen **3**, **4** en **5** rustig uit.

Spoel na gebruik uw mond met water en spuug het spoelwater uit; dit verkleint de kans op schimmelslag in de mond. Plaats na gebruik het kapje altijd weer op het mondstuk tegen stof en vuil. Heeft u moeite met het gebruik? Neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker.

## Schoonmaken

Door de inhalator minstens één keer per week schoon te maken voorkomt u verstopping.

1. Haal de metalen bus uit de plastic houder van de inhalator. Verwijder het kapje van het mondstuk.
2. Spoel de plastic houder en het kapje van het mondstuk in warm water. Zet het metalen busje niet in het water.
3. Laat het drogen op een warme plaats. Vermijd te sterke hitte.
4. Plaats het busje en het kapje van het mondstuk terug.

