
PATIËNTENWAARSCHUWINGS- KAART VOOR ERELZI (ETANERCEPT)

Deze patiëntenwaarschuwingkaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie waarvan u op de hoogte moet zijn vóór en tijdens de behandeling met Erelzi. Als u iets niet begrijpt, kunt u uw arts om uitleg vragen.

- Laat deze kaart zien aan alle artsen bij wie u onder behandeling bent.
- Zie voor meer informatie ook de bijsluiter van Erelzi.

GEBRUIK BIJ KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR (onder de 62,5 kg)

Erelzi mag niet worden toegediend aan kinderen en jongeren tot 18 jaar die minder wegen dan 62,5 kg. Als u hierover nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw arts.

INFECTIES

Erelzi kan het risico op infecties vergroten.

Dit kan ernstig zijn.

- Als u al een infectie heeft, mag u niet worden behandeld met Erelzi. Overleg in geval van twijfel met uw arts.
- Als u symptomen ontwikkelt die kunnen wijzen op een infectie, zoals koorts, hardnekkige hoest, gewichtsverlies of lusteloosheid, roep dan onmiddellijk medische hulp in.
- U moet worden getest op tuberculose (TBC). Vraag uw arts om de datum en de uitslag van uw meest recente TBC-test hieronder op te schrijven:

Test:

Datum:

Uitslag:

Test:

Datum:

Uitslag:

- Vraag uw arts om andere geneesmiddelen te noteren die bij u het risico op infectie kunnen vergroten.

CONGESTIEF HARTFALEN

Als u symptomen ontwikkelt die kunnen wijzen op **congestief hartfalen of verergering van bestaand congestief hartfalen**, zoals kortademigheid, gezwollen enkels, hardnekkige hoest of vermoeidheid, roep dan onmiddellijk medische hulp in.

Overige informatie (a.u.b. invullen):

Naam patiënt:

Naam arts:

Telefoonnummer arts:

Draag deze kaart bij u vanaf het begin van de behandeling met Erelzi tot twee maanden na uw laatste dosis. Bijwerkingen kunnen namelijk ook nog voorkomen na het toedienen van uw laatste dosis Erelzi.

Het is van groot belang dat u samen met uw arts de merknaam en het batchnummer van uw geneesmiddelen noteert.
